

Bravecto® Chewable Tablets for Dogs.

Лидер на пазарот во заштитата од болви и крлежи.

Bravecto® Chewable Tablets for Dogs е еден од првите во класата на ектопаразитици – револуционерен третман достапен само во ветеринарните амбуланти⁸

- Огромен напредок во областа на заштитата од болви и крлежи.
- Овозможува и до 12 недели заштита само со една орална доза^{2*}
- Познат безбедносен профил и ефикасност кај млади и возрасни кучиња^{6,9}
- Овозможува поедноставно дозирање, придржување кон пропишаните режими на дозирање и задоволство кај клиентите.

Ова е Ваша прилика да понудите поинаков третман, да ги истражите можностите за Вашата пракса и да изградите трајни врски со Вашите клиенти и нивните миленици


MSD Animal Health. Глобален лидер и Ваш партнер во здравјето на

животните. Подготвени сме да помогнеме да:

- Милениците живеат посреќен, поздрав живот, благодарейќи на научните истражувања.
- Грижата на нивните сопственици да биде поедноставна и поефикасна.
- Ветеринарите да користат ексклузивни производи и научни истражувања како би изградиле респект од клиентите и би одржале константен раст на работењето.
- Клиентите да бидат насочени кон Вас.

Reference:

1. Dryden MW, Payne PA, Smith V, et al. Evaluation of indoxacarb and fipronil (s)-methoprene topical spot-in formulations to control flea populations in naturally infested dogs and cats in private residences in Tampa, FL, USA. Parasites and Vectors. 2013; 6:1-15.
2. Rohdich N, Roepke R, Zschiesch E. A randomized, blinded, controlled and multi-centered field study comparing the efficacy and safety of Bravecto™ (fluralaner) against Frontline® (fipronil) in flea- and tick-infested dogs. Parasites Et Vectors. In Press.
3. Sažetak karakteristika leka BRAVECTO® Chewable Tablets for Dogs
4. Gassel M, Wolf C, Noack S, Williams H, Ilg T. The novel isoxazoline ectoparasiticide fluralaner: Selective inhibition of arthropod -aminobutyric acid- and L-glutamategated chloride channels and insecticidal/acaricidal activity. [publication information to come]
5. Beck S, Schein E, Baldermann C, von Samson-Himmelstjerna G, Kohn B. Tick infestation and tickprophylaxis in dogs in the area of Berlin/Brandenburg: results of a questionnaire study. Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 126, Heft 1/2 (2013), Seiten 6-76.
6. Data on File. Merck Animal Health, Summit, NJ. 2013.
7. EPAR [pending publication. On-line link to come.]
8. Ozoe, Y. γ-aminobutyrate- and glutamate-gated chloride channels as targets of insecticides. Chapter four in: Advances in Insect Physiology, Volume 44, 2013, 211-286.
9. Walther FM, Allan MJ, Roepke R, Nuernberger MC. The effect of food on the pharmacokinetics of oral fluralaner in Parasites Et Vectors. In Press.



Некогаш.



NEDELJA DANA SATI

Сега.



NEDELJA DANA SATI


Без алтернативи во терапијата, потрошувачите ќе побараат некои од нерегистрираните производи. Време е да се надмине глобалниот предизвик во лечењето.

Го претставуваме врвот на полето на заштита од болви и крлежи кој овозможува и до 12 недели* заштита со само една таблета за цваќање.
Браво, Bravecto® Chewable Tablets for Dogs.

„Само за стручна јавност“

BRAVECTO®

ВИТА-ВЕТ
СКОПЈЕ



MSD
Animal Health

ВРЕМЕ Е ДА ПОНУДИТЕ НЕШТО ПОИНАКВО.

На голем број ветеринари работата им опаѓа поради нелегалниот канал на продажба.

- Ветеринарите со години бараат начини како би понудиле подобра заштита против болви и крлежи.
- Недостатокот на диференцијација на производите условува корисниците да ги сметаат за меѓусебно „исти“

Вакви третмани против болви и крлежи има малку и полека се појавуваат на пазарот.

- Пријавена е резистенција на еден од најчесто користените - fipronil
- Fipronil +(s)-metopren, активната супстанца во водечкиот производ против болви брзо ја изгуби ефикасноста и тоа многу пред препорачаниот 30-дневен третман¹

ЕФИКАСНОСТ ВО КОНТРОЛАТА НА ИНФЕСТАЦИЈА СО БОЛВИ BRAVECTO® VS. FIPRONIL ²		
	Fluralaner 1 третман	Fipronil 3 третмани
2. недели	97,9	86,9
4. недели	99,8	78,4
8. недели	99,9	86,8
12. недели	99,9	93,0

Ефикасноста во контролата на инфестација со болви на лекот Bravecto® е статистички поголема од ефикасноста во контролата на инфестација со болви со фипронил.

Што ако би постоело нешто поинакво на пазарот што би можело да помогне повторно да се придобијат потрошувачите и истакне како помош која само Вие можете да ја овозможите: лична услуга, континуитет на негата и пристап до различни терапевтски опции?

ГО ПРЕТСТАВУВАМЕ BRAVECTO® CHEWABLE TABLETS FOR DOGS, ПРОИЗВОД ОД MSD ANIMAL HEALTH ПАЛЕТАТА.

Заземете поголем дел на пазарот нудејќи им на Вашите клиенти производ кој не можат да го набават на друго место.

- Врвот на полето на заштита од болви и крлежи кој овозможува и до 12 недели* заштита со само една таблета за цваќање кој е достапен само во ветеринарните амбуланти.

Запознајте се со поинаква класа на заштита:

- Посебно формулиран производ со молекула на флураланер кој ги штити кучињата со долготрајно дејство против болви и крлежи во една таблета за цваќање.
- Нов и специфичен блокатор на GABA и глутаматните рецептори⁴ на инсектите.
- Isoksazolin је прва нова класа на инсектициди после повеќе од деценија⁸
- Bravecto® Chewable Tablets for Dogs почнува брзо да делува и ги уништува болвите и крлежите во текот на целиот интервал на дозирање од 12 недели (8 недели за *Rhipicephalus sanguineus*).
 - Брз почеток на дејството, веќе по 2 часа, со 88% ефикасност после 4 часа³
 - Конзистентна, трајна ефикасност против болви и крлежи³
 - Ефикасност со широк спектар против повеќето распространети видови на болви и крлежи³
- Најдобар избор за ветеринарите за контрола на заразни болести предизвикани со вектори.



Пристап на проблемот кон пропишаниот режим на дозирање
Третманите кои се применуваат еднаш месечно ги оставаат кучињата ранливи

- Истражувањата покажале дека месечните третмани ретко се применуваат редовно, според упатството.⁵
- Податоците покажуваат дека просечно милениците се третираат 2,8 месеци годишно.⁶
- Некои сопственици дури и ја смалуваат дозата со одложување на повторниот третман.
- Примената на топикална терапија може да биде неуредна и често е неправилна.
- Ефикасноста може да опаѓа во текот на неколку недели¹ од примената



Што кога би постоел производ кој би помогнал во елиминирање на овие проблеми еднаш за секогаш?

Со Bravecto® Chewable Tablets for Dogs, едноставното дозирање може да значи поуредно придржување кон пропишаниот режим на дозирање

- Погоден и едноставен за употреба со 12- неделен распоред на дозирање.
 - Една доза овозможува цели 12 недели ефикасност, без престан³
 - Дозирањето е едноставно и чисто без неред при примената и без ризик од пренесување⁷
 - Новонастанатите болви се уништени пред да можат да произведат живи јајца³
 - Заштита за сите годишни времиња постигната со малку повеќе од 4 дози
 - Грешките при примената се скоро елиминирани со погоден орален облик.
- И примамлив за кучињата:
 - Таблета со арома која кучињата баш ја сакаат⁷ - Повеќе од 90% кучиња доброволно ја земале таблетата⁷
 - Режим на издавање на лекот: Лекот може да се издава само од ветеринар.

Сигурен е за миленикот и неговото семејство

- Се применува кај кученца постари од 8 недели (докажано со примена на пет пати поголеми дози³)
- Кај кученца стари 8 до 9 недели и телесна тежина од 2,0 до 3,6 kg не се забележани никакви несакани реакции и по перорална примена на 5 пати повисока доза на fluralaner од максимално препорачаната доза (56 mg, 168 mg и 280 mg fluralaner/kg телесна тежина), применети трократно во интервали пократки од препорачаниот (8-неделен интервал³).
- Безбедноста на овој ветеринарен лек е докажана и кај приплодни мажјаци и женки, гравидни кучки и кучки во лактација³
- Кучиња од расата Коли кај кои е докажано пореметување на MDR1 протеинот (multidrug-resistance-protein 1), добро го толерираат овој лек и не пројавуваат никакви клинички пореметувања после еднократен перорален третман со доза на fluralaner 3x повисока од препорачаната (168 mg/kg).³