УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
на ветеринарно – медицински препарат

Име на ветеринарно – медицинскиот препарат (латиница) – Име на ветеринарно – медицинскиот препарат (македонски јазик)

Duplocillin LA / Дуплоцилин ЛА

фармацевтска форма
Суспензија за инјектирање

генеричко име на ветеринарно – медицинскиот препарат
Benzylpenicillin procaine (Бензилпеницилин прокаин)
Benzylpenicillin benzathine (Бензилпеницилин бензатин)

1. Име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и име и адреса на производителот

Име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет:
ДПТУ ВИТА ВЕТ ДОО увоз-извоз Скопје
ул."Тајмишка" бр. 32 - Скопје,
Република Македонија

Име и адреса на производителот:
Intervet Productions S.r.l
Via Nettunense km. 20.300, 04011 Aprilia (LT), Италија

2. Име на ветеринарно – медицинскиот препарат

Duplocillin LA
Дуплоцилин ЛА

3. Содржина на активни супстанции и други состојки

1 ml суспензија содржи:

Активни супстанции:
Бензилпеницилин прокаин 150 mg (150000 IU)
Бензилпеницилин бензатин 125 mg (150000 IU)

Ексципиенси:

Метил-парахидроксибензоат	1.0 mg
Пропил-парахидриксибензоат	0.12 mg

Натриум цитрат дихидрат, калиум дихидроген фосфат, диметикон, сорбитан монопалмитат, полисорбат 40, метил парахидроксибензоат , пропил парахидроксибензоат, натриум хлорид, лецитин, натриум хидроксид (за рагулација на pH), фосфорна киселина (за регулација на pH), вода за инјекции

4. Терапевтски индикации

Третман на инфекции предизвикани од бактерии сензитивни на пеницилин

5. Контраиндикации

Да не се користи кај животни за кои е познато дека се алергични на пеницилин.
Да не се користи кога се знае дека се присутни ß-лактамаза продуцирачки стафилококи.
Да не се користи кај коњи наменети за човечка употреба, или кај птици и глодари.

6. Несакани дејства

Алергиски реакции може да бидат забележани во одредени случаи.

7. Видови на животни за кои што е наменет ветеринарно - медицинскиот препарат

Големи животни (говеда, овци, свињи, коњи).
Мали животни (мачка, куче)

8. Дозирање за секој поединечен вид, начин и фрекфенција на примена и препорака за правилна употреба

Целен вид	**Доза/Телесна тежина**	**Начин на администрација**
Коњ	1 ml/25 kg	со интрамускулна инјекција
Говедо	1 ml/25 kg	со интрамускулна инјекција
Овца	1 ml/20 kg	со интрамускулна инјекција
Свиња	1 ml/20 kg	со интрамускулна инјекција
Куче	1 ml/10 kg	со субкутана инјекција
Мачка	1 ml/10 kg	со субкутана инјкекција

Интервал на третманот 72 часа.

9. Совет за правилна примена

При повторен третман не треба да се користи истото место за инјекција.

10. Каренца на ветеринарно – медицинскиот препарат

Место на инјектирање кај говеда, коњи и свињи:	70 дена
Место на инјектирање кај овци:	56 дена
Месо и органи:	14 дена
Млеко:	5 молзења

11. Начин на чување и рок на употреба

Да се чува на температура помеѓу 2 и 8 °C. Да не се замрзнува. Да се чува вон дофат на деца.
Рок на траење на ветеринарно-медицинскиот прапарат во оригиналното пакување за продажба: 3 години.
Рок на траење по првото отворање на директното пакување: 28 дена

12. Посебни мерки на претпазливост

Да не се користи кај животни алергични на пеницилин.

Посебни мерки на претпазливост кои треба да бидат превземени од страна на лицето кој го администрира ветеринарно-медицинскиот препарат кај животните

При повторен третман не треба да се користи истото место за инјекција. Лица кои се алергични на пеницилин треба да избегнуваат контакт на кожата со препаратот.

Користење во текот на гравидитет и лактација
Не се потребни посебни мерки на претпазливост.

Интеракција со други медицински препарати и други форми на интеракција
Може да се појави антагонизам помеѓу Duplocillin и бактериостатските препарати. Може да се појават резистентни бактерии, кои покажуваат вкрстена резистенција кон други ß-лактамски антибиотици. Забележан е синергизам со други бактерицидни прапарати.

13. Посебни предупредувања за отстранување на неупотребениот ветеринарно – медицински препарат или отпадниот материјал од ветеринарно – медицинскиот препарат

Секој неискористен ветеринарно-медицински препарат или отпадните материјали добиени од користењето на таквите ветеринарно-медицински препарати треба да биде отстранет во согласност со локалната регулатива.

14. Останати информации

Само за третман на животни.

15. Пакување

Duplocillin LA се пакува во стаклени или PET-садови со чепови од халогенирана-бутилна гума.
Големини на пакување: 100 и 250 ml стаклени садови, 100 и 250 ml PET-садови
Сите големини на пакување на мора да бидат ставени во промет.

16. Начин на издавање

Ветеринарно медицински препарат што се употребува само во ветеринарно друштво од доктор по ветеринарна медицина.

17. ATC вет код

ATC вет код: QJ01CE
Фармакотерапевтска група: Пеницилини осетливи на β лактамаза

18. АХВ број

1342

19. Број на одобрението за ставање во промет на ветеринарно – медицинскиот препарат

16-4119

20. Датум на последна ревизија на упатството за употреба

30.03.2018