

Контрола на најчестите нематоди во текот на целиот живот¹

Кученца

Од 2-неделна возраст, на секои 14 дена сè до 2 недели по одбивањето и потоа месечни третмани до возраст од 6 месеци.

Животен стил на кучињата и ризици поврзани со него:



Кучето **престојува само во домашни услови** или излегува надвор, но **нема директен контакт со други кучиња**, паркови, песочни површини, игралишта, полжави, сирово месо или животни кои можат да му бидат плен.

Третирајте го кучето 1-2 пати годишно против аскарини или спроведете преглед на фецесот



Излегува надвор и има директен контакт со паркови, песочни површини, игралишта и други кучиња, но не го јаде пленот, не лови без надзор и не јаде полжави и сирово месо.

Третирајте го кучето 4 пати годишно против аскарини или спроведете преглед на фецесот



Излегува надвор и има директен контакт со паркови, песочни површини, игралишта и други кучиња и го јаде својот плен, лови без надзор, јаде полжави и сирово месо.

Третирајте го кучето 4-12 пати годишно против аскарини и тении зависно од факторите на ризик

Сите информации поврзани со бројните аспекти на контрола на паразитите може да се најдат во ESCCAP водичот.

Податоците за препаратот се наведени врз основа на збирниот извештај.
¹ESCCAP Водич за контрола на внатрешни паразити кај кучиња и мачки
Мај 2021 Drontal Puppy суспензија
Активни супстанции: 14,4 mg/ml пирантел ембонат, 15,0 mg/ml фебантел
Drontal Puppy, Elanco и логото со дијагонална лента се заштитни знаци на Elanco или на неговите филијали. Вауер и Крстот на Bayer се заштитни знаци на Bayer. © 2022 Elanco PM-MK-22-0019



Тajмшка бр. 32 1000 Скопје
02 2614 681 | 02 2636 588 | 070/270-963
www.vita-vet.mk | fb/vita-vet

Elanco

Drontal® Puppy суспензија




за кученца и млади кучиња



Drontal® Puppy

Drontal Puppy суспензија

За кученца и млади кучиња

Анкилостоми		<i>Uncinaria stenocephala,</i> <i>Ancylostoma caninum</i>
Аскариди		<i>Toxocara canis,</i> <i>Toxascaris leonina</i>
Трихуриди		<i>Trichuris vulpis</i>

Дозирање

15 mg
фебантел


+

14,4 mg
пирантел

/ 1 kg телесна тежина

Со
Drontal Puppy
суспензија

Од 2-неделна возраст 1 ml на 1 kg телесна тежина
на секои 2 недели



ПРОГРАМА ЗА ДЕХЕЛМИНИЗАЦИЈА ЗА КУЧЕНЦА СОГЛАСНО ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites): Третман на аскариди од 2-неделна возраст, на секои 14 дена сè до 2 недели по одбивањето и потоа месечни третмани до возраст од 6 месеци.¹

1 

Протресете
пред употреба!

2  или 

Суспензијата може да се дава директно со
шприц или помешано со храна.

Фармакодинамски својства



Пирантелот и фебантелот
дејствуваат синергично против
нематоди (аскариди,
анкилостоми и трихуриди).



Двете активни состојки
се многу добро докажани
антихелминтски супстанции и се
во широка употреба одделно и
во комбинирани препарати.

